

METODO ANTICONCEPTIVO

IMPLANTE SUBDÉRMICO

Femme Prenatal Center



QUE ES EL IMPLANTE SUB-DERMICO Y COMO ACTUA

Este método anticonceptivo consiste en una pequeña varilla flexible de plástico, menor del tamaño de un fósforo, que se introduce justo debajo de la piel en la parte superior del brazo. El implante libera progestina en el cuerpo. Ha sido aprobado para usarse hasta por 3 años. La progestina en el implante evita un embarazo principalmente impidiendo que ocurra la ovulación. Además, la progestina en el implante hace que aumente la densidad del moco cervical, lo cual dificulta la entrada de los espermatozoides al útero y por consiguiente la capacidad para llegar a un óvulo. La progestina también reduce el grosor del revestimiento del útero.

UTILIZAMOS SOLO ELEMENTOS DE LA MEJOR CALIDAD Y PERSONAL CON EXPERIENCIA



BENEFICIOS DEL IMPLANTE

- Es cómodo y fácil de usar. Una vez que se haya colocado, no es necesario hacer nada más para evitar que ocurra un embarazo, ni tampoco sentirás ninguna molestia .
- También es eficaz durante mucho tiempo. Nadie puede darse cuenta que está usando un anticonceptivo ya que no es posible ver el implante debajo de la piel.
- Se puede colocar inmediatamente después de un aborto provocado, un aborto natural o del nacimiento de un bebé y mientras esté amamantando.
- No interfiere en las relaciones sexuales ni en las actividades diarias. Casi todas las mujeres pueden usar el implante, son pocos los problemas médicos que impiden usarlo.
- Reduce el dolor durante el período menstrual.
- Si deseas quedar embarazada o dejar de usarlo, puedes simplemente pedir que te extraigan el implante. Puedes tratar de quedar embarazada en cuanto se extraiga el implante.



COMO SE COLOCA EL IMPLANTE

- El implante se puede colocar en cualquier momento durante el ciclo menstrual siempre que se tenga una certeza razonable de que no está embarazada. Un ginecólogo-obstetra u otro profesional de atención médica introducirá el implante en el brazo. Para hacerlo, adormecerá una pequeña área en el interior de la parte superior del brazo con un medicamento local para el dolor. El implante se coloca debajo de la piel con un instrumento especial. No hay que hacer una incisión. El procedimiento dura solo unos cuantos minutos.
- Es posible que ocurra un leve moretón después de que se introduzca el implante. Para reducir la formación de un moretón, coloque una gasa estéril con un vendaje de presión por 24 horas.
- Si se coloca un implante después de 5 días del comienzo de su período menstrual, no debes tener relaciones sexuales o usar un método de respaldo, como un condón, durante los próximos 7 días. El implante protege contra un embarazo inmediatamente después de que se coloca dentro de un plazo de 5 días del comienzo de su período menstrual.

TE PROPORCIANAMOS TODO LO QUE NECESITAS PARA ELIMINAR CUALQUIER MARCA EN LA PIEL

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS


- Al igual que el dispositivo intrauterino, eventualmente el implante hace que ocurran cambios en el sangrado menstrual. Contamos con tratamiento para corregir este trastorno en caso que se presente.
- El aumento de peso se puede presentar sólo sino hay una dieta balanceada.



CONTARAS CON SEGUIMIENTO ESTRECHO Y RESPUESTA A TODAS TUS PREGUNTAS ANTES Y DESPUES DE LA CONSULTA

 [consultoriosusana](https://www.facebook.com/consultoriosusana)

Citas: 777 451 09 05

 [drasusanasoto](https://www.instagram.com/drasusanasoto)

VISITA: WWW.MEDICOPERINATAL.COM PARA MAS INFO